

Fumar aumenta risco de reincidência do cancro da próstata

22-Jun-2011



Os homens com cancro da próstata e que fumam quando lhes é diagnosticada da doença têm risco acrescido de reincidência da patologia após o tratamento e morrer, revela um estudo publicado nos Estados Unidos.

Médicos portugueses, contactados pela "Lusa", salientam, sinteticamente, o contributo negativo do tabaco para a saúde.

Segundo o estudo, citado pela agência "AFP", o tabaco agrava a intensidade do tumor e aumenta os riscos de reincidência da doença e de mortalidade, incluindo a cardiovascular.

A investigação, publicada na edição de 22 a 29 de Junho da revista "Journal of the American Medical Association", abrangeu um universo de 5.366 homens com cancro da próstata, entre 1986 e 2006.

Cientistas da Universidade de Harvard concluíram que os fumadores apresentam 61% mais riscos de terem novamente cancro e de morrerem do que os não fumadores.

Ainda de acordo com o estudo, os fumadores aos quais foi diagnosticado um cancro da próstata sem metástases tiveram 80% mais riscos de terem um cancro generalizado do que os não fumadores.

Ao invés, os homens que deixaram de fumar dez anos antes do diagnóstico reduziram o risco de mortalidade ao mesmo nível dos não fumadores.

O presidente do Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos, Jorge Espírito Santo, salienta que o estudo confirma que o tabaco «é um agente causador de tumores» e, daí, «a necessidade de não se fumar».

Para o presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, Ricardo Luz, trata-se de «mais uma evidência» de que os doentes com cancro «pioram» com o consumo de tabaco.

[< Artigo anterior](#)[Artigo seguinte >](#)[\[Voltar \]](#)